

**Листовка: информация за потребителя**

**Зинат 250 mg филмирани таблетки**  
**Zinnat 250 mg film-coated tablets**

**Зинат 500 mg филмирани таблетки**  
**Zinnat 500 mg film-coated tablets**

**Цефуроксим (Cefuroxime)**

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Зинат и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зинат
3. Как да приемате Зинат
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зинат
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Зинат и за какво се използва**

Зинат е антибиотик, който се използва при възрастни и деца. Той действа като унищожавател на бактериите, които причиняват инфекции. Принадлежи към група лекарства, наречени *цефалоспоринови*.

Зинат се използва за лечение на инфекции на:

- гърлото
- синусите
- средното ухо
- белите дробове или гърдите
- пикочните пътища
- кожата и меките тъкани.

Зинат може да се използва и за:

- лечение на Лаймска болест (инфекция, която се разпространява от паразити, наречени кърлежи).

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зинат**

**Не приемайте Зинат:**

- ако сте алергични (*свръхчувствителни*) към някои цефалоспоринови антибиотици или към някоя от останалите съставки на Зинат.



- ако някога сте имали тежка алергична реакция (реакция на свръхчувствителност) към някой друг тип бета-лактамни антибиотици (пеницилини, монобактами и карбапенеми).
- ➔ Ако смятате, че това се отнася до Вас, не приемайте Зинат, преди да сте се консултирали с Вашия лекар.

### Обърнете специално внимание при употребата на Зинат

Зинат не се препоръчва при деца на възраст под 3 месеца, тъй като безопасността и ефективността му в тази възрастова група не са известни.

Трябва да следите за някои симптоми като алергични реакции, гъбични инфекции (като *кандида*) и тежка диария (*псевдомембранозен колит*), докато приемате Зинат. Това ще намали риска от възможни проблеми. Вижте 'Състояния, за които трябва да следите' в точка 4.

### Ако трябва да Ви се прави изследване на кръвта

Зинат може да повлияе на резултатите от изследване на нивото на кръвната захар или на резултатите от едно изследване на кръвта, наречено тест на Кумбс. Ако Ви е необходимо изследване на кръвта:

- ➔ Уведомете лицето, вземащо пробата, че приемате Зинат.

### Други лекарства и Зинат

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Лекарства, които се използват за намаляване на киселините в стомаха (напр. *антиациди*, които се използват за лечение на *стомашни киселини*), могат да повлияят действието на Зинат.

Пробененид

Перорални антикоагуланти

- ➔ Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате такива лекарства.

### Противозачатъчни хапчета

Зинат може да намали ефективността на противозачатъчните хапчета. Ако приемате противозачатъчни, докато сте на лечение със Зинат, трябва също да използвате и **барьерен метод на контрацепция** (като презервативи). Обърнете се към Вашия лекар за съвет.

### Бременност, кърмене и фертилитет

Кажете на Вашия лекар, преди да започнете да приемате Зинат:

- ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност
- ако кърмите.

Вашият лекар ще прецени ползата от лечението със Зинат за Вас спрямо риска за Вашето бебе.

### Шофиране и работа с машини

Зинат може да причини замаяност и да има други нежелани реакции, които да понижат вниманието Ви.

- ➔ Не шофирайте и не работете с машини, ако не се чувствате добре.

### 3. Как да приемате Зинат

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.



Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**Приемайте Зинат след хранене. Това ще направи лечението по-ефективно.**

Поглъщайте таблетките Зинат цели с малко вода.

**Таблетките не трябва да се дъвчат, чупят или разделят, тъй като това може да намали ефективността на лечението.**

#### **Обичайна доза**

##### **Възрастни**

Обичайната доза на Зинат е 250 mg до 500 mg два пъти дневно, в зависимост от тежестта и типа на инфекцията.

##### **Деца**

Обичайната доза на Зинат е от 10 mg/kg (максимална доза 125 mg) два пъти дневно до 15 mg/kg (максимална доза 250 mg) два пъти дневно, в зависимост от:

- тежестта и типа на инфекцията.

**Зинат не се препоръчва за деца на възраст под 3 месеца, тъй като безопасността и ефективността не са известни за тази възрастова група.**

В зависимост от заболяването или от Вашия отговор, или от отговора на детето Ви към лечението, началната доза може да се промени или да е необходим повече от един курс на лечение.

#### **Пациенти с бъбречни проблеми**

Ако имате бъбречен проблем, Вашият лекар може да промени дозата Ви.

➔ **Говорете с Вашия лекар, ако това се отнася до Вас.**

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Зинат**

Ако приемете повече от необходимата доза Зинат, може да имате неврологични нарушения и по-специално вероятността да получите гърч е по-голяма.

➔ **Не отлагайте. Незабавно се свържете с Вашия лекар или с най-близкото спешно отделение. Ако е възможно, покажете им опаковката на Зинат.**

#### **Ако сте пропуснали да приемете Зинат**

**Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза по обичайното време.**

#### **Не спирайте приема на Зинат без да сте се посъветвали с Вашия лекар**

**Важно е да завършите целия курс на лечение със Зинат. Не спирайте приема на лекарството, дори и да се чувствате по-добре, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва да го направите. Ако не завършите целия курс на лечение, инфекцията може да се появи отново.**

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



### Състояния, за които трябва да следите

Малък брой хора, които приемат Зинат, получават алергична реакция или потенциално сериозна кожна реакция. Симптомите на тези реакции включват:

- тежка алергична реакция. Признаците ѝ включват надигнат и сърбящ обрив, подуване, понякога на лицето или устата, което може да причини затруднено дишане.
  - кожен обрив, който може да има мехурчета и да изглежда като малки мишени (тъмно петно в центъра, заобиколено от по-светла област с тъмен пръстен около нея).
  - широкоразпространен обрив с мехури и лющене на кожата (това може да са признаци на синдром на Стивънс-Джонсън или на токсична епидермална некролиза).
  - гъбични инфекции. Лекарства като Зинат могат да причинят свръхрастеж на дрожди (*кандида*) в организма, което може да доведе до гъбични инфекции (като млечница). Тази нежелана реакция е по-вероятна, ако приемате Зинат за продължителен период от време.
  - тежка диария (*псевдомембранозен колит*). Лекарства като Зинат могат да причинят възпаление на дебелото черво, водещо до тежка диария, обикновено с кръв и слуз, стомашна болка и повишена температура.
  - реакция на Яриш-Херксхаймер. Някои пациенти може да развият висока температура (треска), втрисане, главоболие, мускулни болки и кожен обрив, докато са на лечение със Зинат за Лаймска болест. Това е известно като *реакция на Яриш-Херксхаймер*. Симптомите обикновено продължават няколко часа или най-много един ден.
- ➔ **Незабавно се свържете с лекар или медицинска сестра, ако получите някой от тези симптоми.**

### Чести нежелани реакции

Могат да засегнат до 1 на 10 човека:

- гъбични инфекции (като *кандида*)
- главоболие
- замаяност
- диария
- гадене
- стомашна болка.

Чести нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

- повишаване на тип бели кръвни клетки (*еозинофилия*)
- повишаване на чернодробните ензими.

### Нечести нежелани реакции

Могат да засегнат до 1 на 100 човека:

- гадене
- кожни обриви.

Нечести нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

- понижаване на броя на тромбоцитите (клетки, които помагат за съсирването на кръвта)
- понижаване на броя на белите кръвни клетки
- положителен тест на Кумбс.

### Други нежелани реакции

Други нежелани реакции са наблюдавани при много малък брой хора, но точната им честота е неизвестна:

- тежка диария (*псевдомембранозен колит*)



- алергични реакции
- кожни реакции (включително тежки)
- висока температура (*треска*)
- пожълтяване на бялото на очите или на кожата
- възпаление на черния дроб (*хепатит*).

Нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

- много бързо разрушаване на червените кръвни клетки (*хемолитична анемия*).

**Ако получите нежелани реакции**

→ Уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

## 5. Как да съхранявате Зинат

Да се съхранява под 30°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**Какво съдържа Зинат**

Активното вещество е цефуроксим под формата на цефуроксим аксетил. Всяка таблетка съдържа 250 mg или 500 mg цефуроксим.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, натриев лаурилсулфат, хидрогенирано растително масло, колоиден силициев диоксид, пропиленгликол, метилхидроксипропилцелулоза, метилпарахидроксибензоат, пропилпарахидроксибензоат и опаспрей бяло.

**Как изглежда Зинат и какво съдържа опаковката**

Зинат 250 mg таблетки са бели до почти бели на цвят с означение “GXES7” от едната страна.

Зинат 500 mg таблетки са бели до почти бели на цвят с означение “GXEG2” от едната страна.

Таблетките се предлагат в блистерни опаковки, съдържащи 10 филмирани таблетки.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**Притежател на разрешението за употреба:**

ГлаксоСмитКлайн ЕООД, бул. Цариградско шосе № 115 Г, София 1784, България

**Производител:**

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations), Harrogate, West Yorkshire, England, UK  
Castle, County Durham, DL12 8DT, Великобритания



**Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:**

**250 mg филмирани таблетки**

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания – Zinnat

Германия – Elobact

Гърция – Zinadol

Италия – Zoref

Италия – Orahim

Португалия – Zipos

Португалия – Zoref

Испания – Cefuroxima Allen

Испания – Cefuroxima Solasma

**500 mg филмирани таблетки**

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Великобритания – Zinnat

Германия – Elobact

Гърция – Zinadol

Италия – Zoref

Италия – Orahim

Португалия – Zipos

Португалия – Zoref

Испания – Cefuroxima Allen

Испания – Cefuroxima Solasma

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

