

ЛИСТОВКА

Capsule, soft

VITAMIN A**СЪСТАВ :**

Една капсула съдържа активна съставка :

- Retinol palmitate (Vitamin A) - 2.5 mg (2500 IU)
- Retinol palmitate (Vitamin A) - 4.5 mg (4500 IU)
- Retinol palmitate (Vitamin A) - 50 mg (50000 IU)

ДЕЙСТВИЕ :

Витамин А стимулира растежа и възстановителните процеси в кожата и лигавиците.

От жизнено важно значение е за зрението, за нормален растеж и диференциране на тъканите. Необходим е при синтеза на половите и надбъбречните хормони и кортикостероиди.

Повишава защитните сили на организма.

ПОКАЗАНИЯ :

- Недостиг на витамин А в организма на възрастни и деца, изразен с бърза уморемост, липса на апетит, намалена киселинност и др.;
- Повишена чувствителност към светлина, ксерофтальмия, дискератоза на роговицата и конюнктивата;
- При повишени нужди на организма от витамин А - бременност; кърмене; усилен растеж при деца; лечение с някои медикаменти (холестирамин, колестипол, сукралфат);
- Като допълнително лечебно средство в комплексната терапия на следните групи заболявания : акне вулгарис, дерматити, екземи, дискератоза, трудно заздравяващи рани, изгаряния; нарушения в обонянието и сух ринит; язвена болест захарен диабет, хипертиреозидизъм; инфекциозни и чести респираторни заболявания; изоставане в растежа при деца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към някой от компонентите на препарата, хипервитаминоза А, тежки бъбречни заболявания.

С внимание се прилага при болни с остър миокарден инфаркт, миокардиосклероза, хиперхолестеролемия; бременни жени, особено в първия триместър на бременността ; деца .

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

При продължително приложение на високи дози витамин А (над 40 000 IU дневно за възрастни и 20 000 IU дневно за деца) може да се наблюдават следните реакции : сънливост, менструални нарушения, алергични реакции.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Ако при вземане на витамин А приемате и други лекарствени средства, уведомете лекуващия лекар.

- Витамин Е повишава степента на резорбция на витамин А, усилва действието му , предпазва го от окислително разграждане.
- Витамин А от своя страна повишава специфичните антистерилитетни ефекти на витамин Е.
- Сукралфат, лаксативните средства, холестирамин, колестипол, неомицин понижават дуоденалната резорбция на препарата.
- Оралните контрацептивни средства понижават плазмените нива на витамина и го изчерпват от депата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Някои заболявания изискват внимателно използване на витамин А - остър инфаркт на миокарда , миокардиосклероза, повишени нива на холестерола в кръвта.

Витамин А се употребява от деца , само след назначение от лекар.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Може да се използва от бременни жени и в периода на кърмене само след назначение от лекар и строго спазване на препоръчаната дозировка.

Витамин А преминава в майчиното мляко.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ; РАБОТА С МАШИНИ

От шофьори и лица, работещи с машини , да се употребява след назначение от лекар, тъй като може да предизвика главоболие и световъртеж, ако се взема във високи дози (60 000 - 100 000 IU).

СВРЪХДОЗИРАНЕ

Когато едно лекарствено средство се употреби в доза , по-висока от назначената , е възможно да се развие свръхдозироване .

При свръхдозироване с витамин А обикновено са налице следните симптоми - упорито гадене и повръщане, силно главоболие, безсъние и световъртеж.

При наличие на някой от описаните симптоми или при приемане на доза, по-висока от определената е необходимо да преустановите приема на препарата , да се обърнете за съвет към вашия лекуващ лекар или да посетите най-близкото лечебното заведение.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Прилага се в зависимост от вида на заболяването и възрастта.

При недостиг на витамин А :

- като профилактично средство - дневна доза от 2500 до 5000 IU в зависимост от възрастта;
- като лечебно средство в продължение на 1-2 седмици ежедневно както следва:
 - възрастни - 10 000 - 30 000 IU
 - деца на възраст 4-6 години - 5000 IU
 - деца на възраст над 6 години - 5 000 - 10 000 IU

Като допълнително средство в комплексната терапия на други заболявания , препоръчваните дневни дози са :

- деца на възраст 4-6 години - 2 500 IU ;
- деца на възраст над 6 години - 2500 - 3500 IU;
- жени - 4000 IU
- мъже - 5000 IU
- бременни жени - 5000 IU
- кърмачки - 6 000 IU

Капсулите се приемат несдъвкани след хранене с достатъчно количество течност или мляко в детската възраст.

СЪХРАНЕНИЕ

В сухи, защитени от пряка слънчева светлина места, при температура под 25°C.

СРОК НА ГОДНОСТ

3 (три) години

Да не се употребява след изтичане на посочения срок на годност !

ДА СЕ ПАЗИ НА МЕСТА , НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА !

АКТУАЛНОСТ - м. октомври 1999 г.

БАЛКАНФАРМА - ТРОЯФАРМ АД ,

BULGARIA 5600, Troyan, P.O. Box 82