

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 26090557
Разрешение № 18738 / 10.07.2012
Одобрение № /

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване

Бутамиратов цитрат

SINECOD 50 mg Prolonged-release tablets

Butamirate citrate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако сле 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване**
3. Как да използвате **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация



1. Какво представлява СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване

СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване съдържа активното вещество бутамиратов цитрат, което принадлежи към групата лекарствени средства за потискане на кашлицата. **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване** се използва за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Не използвайте СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване

- Ако сте алергични към активното вещество бутамиратов цитрат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с вашия лекар или фармацевт преди да използвате **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване**. Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако кашлицата продължава повече от 7 дни.

Други лекарства и СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване

Избягвайте едновременната употреба на **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване** с други противокашлични средства, защото това може да доведе до задържане на секрет в дробовете ви.

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително лекарства или хранителни добавки, отпуснати без рецепта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите не използвайте **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване**, освен ако не ви е препоръчано от вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

В редки случаи, **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване** може да намали бдителността при някои хора, в сравнение с нормалното състояние. Ако това се прояви при вас, трябва да сте предпазливи в използването на това лекарство при шофиране или работа с машини.



Вашето дете трябва да избягва карането на велосипед или скутер в уличното движение, когато използва **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване**.

СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване:

Лактоза монохидрат: ако вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него преди да използвате **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване**.

3. Как да използвате СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в листовката или както ви е казал вашия лекар или фармацевт.

Не използвайте **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване** повече от 7 дни (една седмица) без да се посъветвате с вашия лекар.

Юноши над 12 години: 1 или 2 таблетки дневно;

Възрастни : 2 или 3 таблетки дневно на 8- или 12-часов интервал. Таблетките да се гълтат цели.

Ако сте използвали повече от необходимата доза СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване

Ако сте използвали повече от необходимата доза **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване**, консултирайте се веднага с вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции могат да се появят в редки случаи (могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 10000 човека) - сънливост, кожни обриви, гадене и диария. Тези нежелани реакции трябва да изчезнат след намаляване на дозата или спиране на лечението.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Не използвайте **СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване** след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте в оригиналната опаковка - блистер.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване

Активното вещество е бутамиратов цитрат.

Другите съставки (помощни вещества) са: силициев диоксид, хидрофобен колоиден, повидон, рициново масло, хидрогенирано, магнезиев стеарат, хипромелоза, съполимер на метакрилова киселина етакрилат, лактоза монохидат, винена киселина, еритрозин алуминиев лак, титаниев диоксид, червен железен оксид, полисорбат 80, талк, полиакрилатна дисперсия.

Как изглежда и какво съдържа опаковката

СИНЕКОД се предлага под формата на перорални капки, разтвор, сироп и таблетки с удължено освобождаване.

СИНЕКОД 50 mg Таблетки с удължено освобождаване са керемиденочервени, лакирани, кръгли, биконвексни филмирани таблетки с надпис РТ от едната страна и знака на Zuma от другата страна. Разпространява се на блистери.

Опаковка: 10 таблетки на блистер.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Германия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Салвис Фарма ООД,
София 1528, ул. Димитър Пешев 5,
тел.: +359 882532901

Дата на последно преразглеждане на листовката

