

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 2011053
Разрешение № 25769 / 19-05-2014
Одобрение № /

Листовка: информация за потребителя

ТАНАКАН 40 mg филмирани таблетки
TANAKAN 40 mg film-coated tablets
Гинко билоба, сух стандартизиран екстракт от листа
Ginkgo bilobae folium extractum siccum normatum (EGb 761)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ТАНАКАН 40 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ТАНАКАН 40 mg
3. Как да приемете ТАНАКАН 40 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТАНАКАН 40 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ТАНАКАН и за какво се използва

ТАНАКАН 40 mg се предписва за:

- Симптоматично лечение на болестно нарушение в концентрацията и паметта при възрастни пациенти с изключение на болест на Алцхаймер и други деменции.
- Симптоматично лечение на артериити на долните крайници (болест на артериите на краката, предизвикващи болезнени крампи по време на ходене)
- При симптоми свързани с нарушения на зрението и слухово-вестибуларния смущения с предполагаем исхемичен произход.
- При синдром на Рейно.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете ТАНАКАН

Не приемайте ТАНАКАН

Ако сте алергични към екстракта от листа на гинко билоба или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).



Предупреждения и предпазни мерки

- Ако приемате други лекарства моля прочетете и раздела "*Други лекарства и ТАНАКАН*"
- ТАНАКАН 40 mg филмирани таблетки съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост на някои захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.

Други лекарства и ТАНАКАН

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. ТАНАКАН може да повлияе действието на някои други лекарства.

Примери за лекарства, които могат да засегнат действието на ТАНАКАН, са:

- Алфентанил и фентанил (опиоидни лекарства за облекчение на болка)
- Циклоспорин, сиролимус и такролимус (лекарства за потискане на имунната система)
- Дихидроерготамин и ерготамин (алкалоиди на моравото рогче, използвани за лечение на мигрена)
- Пимозид (използван за лечение на психични заболявания)
- Хинидин (използван за лечение на нарушения на сърдечния ритъм)

Все пак имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

ТАНАКАН с храна и напитки

ТАНАКАН се приема по време на хранене.

Бременност и кърмене

Трябва да избягвате да приемате ТАНАКАН, ако сте бременна или кърмите. Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна, планирате бременност или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Някои хора могат да почувстват замаяност след използването на ТАНАКАН. Ако това Ви се случи, не шофирайте и не използвайте машини.

ТАНАКАН съдържа лактоза

Поради наличието на лактоза, това лекарство не трябва да бъде използвано при наличие на галактоземия, на синдром на лоша абсорбция на глюкоза и галактоза или при дефицит на лактаза (рядко срещани болести на обмяната на веществата).

3. Как да приемате ТАНАКАН

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

3 таблетки дневно, разпределени през деня.



Таблетките трябва да се приемат с половин чаша вода по време на хранене.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Резюме на профила на безопасност

Най-честите нежелани реакции са: коремна болка, диария и виене на свят.

Ако получите тежка алергична реакция (ангиоедем), която причинява подуване на лицето, устните, езика или гърлото, спрете незабавно приема на това лекарство и потърсете спешна медицинска помощ.

Други възможни нежелани реакции:

- Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- алергична реакция;
- затруднено дишане;
- главоболие;
- припадък;
- лошо храносмилане;
- гадене;
- екзема;
- сърбеж.

- Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- копривна треска;
- обрив.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване

Изпълнителната агенция по лекарствата,

ул. „Дамян Груев“ № 8,

1303 София,

тел.: +35928903417,

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ТАНАКАН

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.



Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на целостта на блистера.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ТАНАКАН

- Активното вещество е Гинко билоба, сух стандартизиран екстракт от листа (EGb 761)
- Другите съставки са: таблетно ядро – лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, царевично нишесте, силициев диоксид, колоиден безводен, талк, магнезиев стеарат; обвивка – макрогол 400, макрогол 6 000, хипромелоза, титанов диоксид, червен железен диоксид.

Как изглежда ТАНАКАН и какво съдържа опаковката

Филмирани таблетки, светло кафяви на цвят, запечатани в блистер (алуминий – PVC), съдържащ 15 таблетки. Картонена кутия с два блистера, 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

IPSEN PHARMA
65, quai Georges Gorse
92100, Boulogne Billancourt
ФРАНЦИЯ

Производител

Beufour Ipsen Industrie
Rue d'Ette Virton, 28100 Dreux,
Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката: 09/2013

