

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**ГАВИСКОН АДВАНС** Сервие №**100 mg/ ml + 20 mg/ ml перорална суспензия**
Натриев алгинат / Калиев хидроген карбонат**GAVISCON ADVANCE****100 mg/ml + 20mg/ml oral suspension**
Sodium alginate / Potassium hydrogen carbonate

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат или не се подобряват след 7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **ГАВИСКОН АДВАНС** и за какво се използва?
2. Преди да приемете **ГАВИСКОН АДВАНС**
3. Как да приемете **ГАВИСКОН АДВАНС**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **ГАВИСКОН АДВАНС**
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГАВИСКОН АДВАНС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Лекарството принадлежи към групата лекарствени продукти, които са наричани "рефлуксни супресори".

Това лекарство се използва за лечение на прояви на гастро-езофагеален рефлукс, като киселинна регургитация, киселини от стомаха и нарушено храносмилане (свързани с рефлукса), например след хранене или по време на бременност, или при пациенти, при които са налице симптоми, свързани с рефлукс езофагит.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ГАВИСКОН АДВАНС**Не приемайте ГАВИСКОН АДВАНС**

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на **ГАВИСКОН АДВАНС**

Важна информация за някои от съставките в продукта.

Този лекарствен продукт съдържа малки количества натрий (4.6 mmol за 10 ml), калий (2.0 mmol за 10 ml) и калций. Ако сте били посъветвани да спазвате определена ограничавана диета по отношение на тези вещества, моля, консултирайте се с Вашия лекар.



Този продукт съдържа метил- (E218) и пропил- (E216) парахидрооксибензоат, които може да предизвикат поява на алергични реакции (възможна е късна изява на проявите на свръхчувствителност).

Бременност и кърмене

Може да приемате този продукт по време на бременност или кърмене.

Съществува възможност за намаляване на ефекта, ако са ниски нивата на солна киселина в стомашния сок.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ГАВИСКОН АДВАНС

Винаги приемайте ГАВИСКОН АДВАНС точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е:

Възрастни, включително пациенти в напреднала възраст и деца над 12 годишна възраст: 5-10 ml (една до две мерителни лъжици) след хранене и преди лягане, или по предписание.

Деца под 12 годишна възраст: Трябва да се прилага само по лекарско предписание.

Ако сте пропуснали да приемете дозата от ГАВИСКОН АДВАНС

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Необходимо е единствено продължаване на лечението, както се е извършвало до този момент.

Ако сте приели повече от необходимата доза ГАВИСКОН АДВАНС

Ако приемете твърде много от продукта, вероятността това да бъде вредно за Вас е минимална. Въпреки това, все още може да чувствате подуване на корема. Консултирайте се Вашия лекар, ако тази проява не отзвучи.

Разклатете преди употреба.

След приема на този продукт:

Ако симптомите не отзвучават след 7 дни трябва да се консултирате с Вашия лекуващ лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ГАВИСКОН АДВАНС може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много рядко (при по-малко от 1 на 10 000 случая) е възможна поява на кожни обриви или затруднения в дишането, вследствие на алергична реакция към някоя от съставките.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВТЕ ГАВИСКОН АДВАНС

Не използвайте ГАВИСКОН АДВАНС след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. • Да се използва до 6 месеца след отваряне на опаковката • Съхранявайте на място, недостъпно за деца. • Да не се замразява. • Проверете дали запечатването на капачето не е счупено преди първа употреба на продукта.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помагат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



Какво се съдържа ГАВИСКОН АДВАНС

Всеки 10 ml перорална суспензия съдържат активните вещества 1000 mg натриев алгинат (sodium alginate) и 200 mg калиев водороден карбонат (potassium hydrogen carbonate).

Другите съставки са: калциев карбонат, карбомер, метил- (E218) и пропил парахидрооксибензоат (E216), захарин-натрий, натриев хидроксид, аромат на анасон, получен от копър и дестилирана вода.

Този продукт не съдържа захар или глутен.

Как изглежда ГАВИСКОН АДВАНС и какво съдържа опаковката

ГАВИСКОН АДВАНС се предлага само за аптеки в бутилки от 150 ml, 300 ml или 500 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Hull, HU8 7DS.

Великобритания

Дата на последно одобрение на листовката:

Юни 2008

