



IV. Образец макет на етикета

FLUORIN 0.55 mg

(Флуорин)

Sodium fluoride

Таблетки за смучене x 100 бр.

"Панацея 2001" София,
ул "Гълъбец" 2, тел 312189

Без лекарско предписание.

Състав: Всяка таблетка съдържа 0.55 mg Sodium fluoride еквивалентно на 0,25 mg флуор, аспартам и други помощни вещества.

Показания: Профилактика на зъбен кариес в детската възраст и при бременност (след 3 месец) и кърмене.

Начин на употреба:

Концентрация на флуор във водата (mg/L)	Препоръчителна добавка на флуор (mg/табл. дневно)	Възраст
< 0.3	0.25 mg (1 табл.) дневно	6 месеца - 2 год.
	0.50 mg (2 табл.) дневно	2 - 4 год.
	1.0 mg (4 табл.) дневно	4 - 15 год.
	1.0 mg (4 табл.) дневно	Бременни след 3 месец и кърмачки
0.3 - 0.7	0.0 mg (не се прилага)	6 месеца - 2 год.
	0.25 mg (1 табл.) дневно	2 - 4 год.
	0.50 mg (2 табл.) дневно	4 - 15 год.
	0.50 mg (2 табл.) дневно	Бременни след 3 месец и кърмачки

Препоръчва се таблетките да се смучат или съдъвкват с оглед по-продължителния им престой в устната кухина. Дозирането се съобразява със съдържанието на флуор в питейната вода, храната и употребата на флуорирани пасти за зъби.

При бебета, таблетките трябва да се счукат и разтворят във вода, чай или плодов сок, но не и в мляко.

Препоръчва се таблетките да се взимат вечер, след измиване на зъбите, като най-малко 30 мин. след това не трябва да се приемат храна и напитки.

При съдържание на флуор в питейната вода по-голямо от 0.7 mg/L да не се прилага.

Противопоказания: Тежка бъбречна недостатъчност, язва на стомаха или дуоденума, болки в ставите, свръхчувствителност към някои от съставките.

Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба:

Съдържа аспартам. Да не се употребява при фенилкетонурия

Да не се приема едновременно с мляко, млечни продукти и антиациди съдържащи алуминий, магнезий или калций. Хроничното приложение на високи дози флуор в периода на образуване на зъбния емаил може да причини флуороза на зъбите при деца и костни промени при деца и възрастни.

Бременност и кърмене: Флуорин може да се прилага при бременност след 3 месец и кърмене

Нежелани лекарствени реакции: Рядко улцерации на устната лигавица.

ПАНАЦЕЯ 2001

Предозирание: Симптомите на остро предозирание са повишено слюнкоотделяне, гадене, повръщане, коремни болки, диария. Необходимо е спешно да се потърси лекарска помощ.

Да се съхранява в оригинални опаковки при температура под 25° на сухо и тъмно място.

Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност.

Срок на годност - 2 (две) години.

Рег. Номер

Партиден номер

Годен до: