

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Тридерм 0,5 mg/10 mg/1 mg/g крем
бетаметазон/клотримазол/гентамицин

Triderm 0,5 mg/10 mg/1 mg/g cream
betamethasone/clotrimazole/gentamicin

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. №

9800149

Разрешение №

П - 10038 / 22. 06. 2010

Освобождение №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите, като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Тридерм крем и за какво се използва
2. Преди да използвате Тридерм крем
3. Как да използвате Тридерм крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тридерм крем
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРИДЕРМ КРЕМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Комбинацията от активните вещества в Тридерм крем е предназначена за облекчаване на възпалителни прояви и оплакванията, свързани с повлияващи се от кортикостероидна терапия дерматози, при налични или подозирани вторични инфекции с бактерии или гъбички.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРИДЕРМ КРЕМ

Не използвайте Тридерм крем

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества: бетаметазон, клотримазол или гентамицин или към някоя от останалите съставки на Тридерм крем.
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към други продукти, съдържащи кортикостероиди.

Обърнете специално внимание при употребата на Тридерм крем

Преди да започнете употребата на Тридерм крем, предупредете Вашия лекар

- за всички други придружаващи заболявания, ако има такива
- ако Вие сте бременна или кърмите.

Тридерм крем не трябва да се употребява върху големи участъци от тялото или под оклузивна (покриваща) превръзка, тъй като това може да доведе до абсорбция на по-голямо количество от активните вещества.

Не употребявайте лекарството по-често или за по-дълго време отколкото Ви е предписал Вашият лекар.

Веднага уведомете Вашия лекар, ако кожното заболяване се влоши или възникне нова инфекция.

Лекарството е предназначено само за кожно приложение. Да не се прилага в очите.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Тридерм крем не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Тридерм крем

Съдържа пропиленгликол. Може да причини дразнене на кожата.

Съдържа цетостеарилов алкохол. Може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРИДЕРМ КРЕМ

Винаги използвайте Тридерм крем точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Два пъти дневно (сутрин и вечер) нанасяйте тънък слой от Тридерм крем върху засегнатия участък и зоната около него и леко масажирайте.

Не прилагайте превръзки и не покривайте кожата по друг начин, освен ако Вашият лекар не ви препоръчва.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Тридерм крем

Прилагайте само дозата, определена от Вашия лекар. Ако сте използвали повече от необходимата доза Тридерм или за по-дълъг период от предписания, незабавно уведомете Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Тридерм крем

Ако забравите да използвате Тридерм крем, приложете лекарството веднага щом си спомните за това, след което продължете по обичайната схема.

Ако сте спрели употребата на Тридерм крем

Вашият лекар ще ви посъветва кога и как да преустановите лечението с Тридерм крем.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Тридерм крем може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщава се за следните локални нежелани реакции: парене, щипене, сърбеж, дразнене, сухота, повишено окосмяване, акне, промяна в цвета на кожата, обезцветяване на кожата, зачервяване на кожата на лицето, кожни инфекции, изтъняване на кожата с повишена ранимост, поява на стрии, мехурчета или уртики по кожата.

Когато лекарството се прилага при деца или юноши, те трябва да се проследяват от лекуващия лекар редовно, тъй като част от лекарствените вещества се абсорбират през кожата и могат да повлияят растежа или да доведат до други нежелани ефекти.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТРИДЕРМ КРЕМ

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Тридерм крем след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Тридерм крем

- Активните вещества са: 0,5 mg/g бетаметазон (като 0,64 mg бетаметазонов дипропионат), 10 mg/g клотримазол и 1 mg/g гентамицин (като гентамицинов сулфат)
- Другите съставки са: течен парафин, бял мек парафин, цетостеарилов алкохол, пропиленгликол, макрогол цетостеарилетер, бензилов алкохол, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, фосфорна киселина, пречистена вода.

Как изглежда Тридерм крем и какво съдържа опаковката

Лекарството се предлага в алуминиеви туби, съдържащи 15 g крем.

Всяка туба, заедно с информационна листовка е поставена в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Schering-Plough Europe
73 Rue de Stalle
B-1180 Brussels
Белгия

Производител

Schering-Plough Labo NV
Heist-op-den-Berg
Белгия

Дата на последно одобрение на листовката:

