

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВНОТО
ОБЩОПРАКТИЧЕСКА МЕДИЦИНА ПО ЛЕКАРСТВЕНАТА
ИНДУСТРИЯ
20060331/30
И-15735-6, 26.10.2011

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КЛЕРИМЕД 250 mg филмирани таблетки

KLERIMED 250 mg film-coated tablets

КЛЕРИМЕД 500 mg филмирани таблетки

KLERIMED 500 mg film-coated tablets

кларитромицин (clarithromycin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява КЛЕРИМЕД и за какво се използва
2. Преди да приемете КЛЕРИМЕД
3. Как да приемате КЛЕРИМЕД
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КЛЕРИМЕД
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛЕРИМЕД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Активното вещество във Вашите таблетки е кларитромицин. Кларитромицин е антибиотик, спадащ към групата, наречена макролиди. Антибиотиците помагат на Вашето тяло да се бори с инфекциите. Клеримед действа като потиска растежа на бактериите, причиняващи инфекция.

Вашият лекар Ви е назначил Клеримед по една от следните причини:

- Вие имате бактериална инфекция на гърлото и синусите
- Вие имате инфекция на гръдния кош като бронхит или пневмония
- Вие имате инфекция на кожата и меките тъкани
- Вие имате инфекция с *Helicobacter pylori*, свързана с язва на дванадесетопръстника

Лекарят ще Ви каже за какво ще се лекувате, както и ще Ви разкаже повече за това.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ КЛЕРИМЕД

Не приемайте КЛЕРИМЕД

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към кларитромицин или към някоя от останалите съставки на КЛЕРИМЕД или към други макролидни антибиотици като еритромицин или азитромицин.
- ако приемате ерготаминови или дихидроерготаминови таблетки.
- ако приемате терфенадин или астемизол (приемани често за сенна хрема или алергии) или таблетки цизаприд, или пимозид.

Обърнете специално внимание при употребата на КЛЕРИМЕД и кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако:

- имате бъбречни проблеми
- имате чернодробни проблеми.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта,

Важно е да кажете на Вашия лекар, ако приемате:

- Дигоксин (лекарство за сърцето)
- Варфарин (лекарство за разреждане на кръвта)
- Ерготамин или дихидроерготамин (при мигрена)
- Карбамазепин или фенитоин (лекарства за лечение на епилепсия)
- Теофилин (подпомага дишането)
- Зидовудин (за лечение на някои инфекции)
- Терфенадин или астемизол (за сенна хрема или алергия)
- Триазолам или мидазолам (седативи)
- Дизопирамид (сърдечно лекарство)
- Симвастатин или аторвастатин (при висок холестерол)
- Цизаприд (при стомашни нарушения)
- Циклоспорин, пимозид, зидовудин, рифабутин (за лечение на някои инфекции) и такролимус (при ораганна трансплантация).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или се опитвате да забременеете, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Не приемайте КЛЕРИМЕД, ако сте бременна, опитвате се да забременеете или подозирате, че може да сте бременна. Ако забременеете докато приемате КЛЕРИМЕД, спрете приема му незабавно и се консултирайте с Вашия лекар.

Не приемайте КЛЕРИМЕД, ако кърмите. Консултирайте се с Вашия лекар преди приема на таблетките, ако кърмите или планирате да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква КЛЕРИМЕД да повлиява на способността Ви за шофиране или за работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛЕРИМЕД

Винаги използвайте КЛЕРИМЕД точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките Клеримед трябва да се поглъщат цели с вода.

При инфекции на гърдния кош, гърлото или синусите, както и при инфекции на кожата и на меките тъкани:

За възрастни и деца над 12 годишна възраст, обичайната доза КЛЕРИМЕД е една таблетка 250 mg два пъти дневно, т.е. една таблетка 250 mg сутринта и една рано вечерта. Обичайната продължителност на лечение е 7 дни. В случай на тежка инфекция лекарят може да увеличи дозата на 500 mg два пъти дневно.

Инфекции с *Helicobacter pylori*, при които таблетките КЛЕРИМЕД се вземат с едно или с две други лекарства. Тези комбинации включват следното:

- Една таблетка КЛЕРИМЕД 500 mg приета два пъти дневно, заедно с амоксицилин 1000 mg, приет два пъти дневно плюс омепразол 40 mg веднъж дневно за 7 дни.
- Една таблетка КЛЕРИМЕД 500 mg приета два пъти дневно, заедно с амоксицилин 1000 mg, приет два пъти дневно плюс омепразол 20 mg веднъж дневно за 10 дни.
- Една таблетка КЛЕРИМЕД 500 mg приета три пъти дневно в продължение на 14 дни, заедно с омепразол 40 mg веднъж дневно.

Комбинираното лечение, което получавате може малко да се различава от горното. Вашият лекар ще реши коя от тези комбинации е най-добра за Вас. Ако не сте сигурни кои таблетки трябва да приемете или колко дълго трябва да ги приемате, моля, консултирайте се с Вашия лекар за съвет.

Старческа възраст:

Прилага се дозата за възрастни.

Ако сте приели повече от необходимата доза КЛЕРИМЕД

Ако случайно сте взели повече таблетки, отколкото трябва, свържете се с лекаря или фармацевта веднага. Ако не можете, отидете в най-близката болница. Винаги носете лекарството със себе си, така че да знаят какво сте взели.

Ако сте пропуснали да приемете КЛЕРИМЕД

Ако пропуснете да приемете доза от това лекарство, приемете я възможно най-скоро. Обаче, ако времето за следващата доза е приближило, пропуснете забравената доза и се върнете към обичайната схема на дозиране. Не вземайте две дози, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на КЛЕРИМЕД

Не спирайте приема на КЛЕРИМЕД, поради това че сте се почувствали по-добре. Важно е, да приемате лекарството си, толкова дълго, колкото лекарят Ви е казал, в противен случай инфекцията може да се възобнови.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КЛЕРИМЕД може понякога да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои хора понякога имат нежелани реакции с КЛЕРИМЕД, като гадене или повръщане, или болка в корема. Ако по време на лечение с КЛЕРИМЕД имате продължителна, тежка диария, спрете приема на лекарството и се консултирайте незабавно с лекаря.

Докато вземате КЛЕРИМЕД стойностите на някои чернодробни ензими могат да се повишат. Тези нива ще се върнат към нормата след края на лечението. Много рядко някои хора по време на лечение с КЛЕРИМЕД развиват нарушения на жлъчния мехур или черния дроб. Ако почувствате общо неразположение или забележите, че очите Ви са пожълтели, урината Ви е тъмна или изпражненията Ви са светли, веднага се консултирайте с лекаря.

Някои хора, докато приемат КЛЕРИМЕД, забелязват странен вкус в устата си. Също езикът им може да потъмнее. Не се тревожете. Няма нужда да спирате лечението поради тези симптоми.

Както с всички лекарства, някои хора могат да имат алергични реакции след прием на кларитромицин. Ако чувствате затруднения в дишането или забелязвате кожен обрив, или отоци на устните и лицето, спрете приема на лекарството и незабавно се консултирайте с лекаря или болница.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛЕРИМЕД

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25° С. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се пази от светлина и влага.

Не използвайте след изтичане срока на годност, посочен върху картонената кутия и блистерите.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КЛЕРИМЕД

- Активното вещество е кларитромицин.

КЛЕРИМЕД 250 mg филмирана таблетка съдържа като активно вещество 250 mg кларитромицин.

КЛЕРИМЕД 500 mg филмирана таблетка съдържа като активно вещество 500 mg кларитромицин.

- Другите съставки са: кроскармелоза натрий, микрокристална целулоза, силициев диоксид, магнезиев стеарат, повидон, стеаринова киселина, талк, хипромелоза, пропилен гликол, сорбитанов олеат, ванилия, хинолиново жълто (Е 104), титанов диоксид (Е 171), хидроксипропил целулоза, сорбинова киселина.

Как изглежда KLERIMED и какво съдържа опаковката

КЛЕРИМЕД 250 mg филмирани таблетки са жълти, с овална форма, с делителна черта от едната страна.

КЛЕРИМЕД 500 mg филмирани таблетки са жълти, с овална форма.

Таблетките са опаковани в PVC/PVDC-Al блистери в кутии с 12, 14 или 20 броя таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Medochemie Ltd.,

1-10 Constantinoupoleos str., 3011 Limassol

Кипър

Tel: + 357 25867600,

Fax: + 357 25560863

Производител:

Medochemie Ltd., "Central Factory", 1-10 Constantinoupoleos Str., Limassol, Кипър.

Medochemie Ltd., "Factory AZ", Mich. Erakleos, Ag. Athanasios Industrial Area, Limassol, Кипър.

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Пълната информация за Клеримед не е в тази листовка. Ако искате да знаете повече или имате някакви въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно одобрение на листовката: Февруари 2010 година