

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА 46 / 18.01.10

Одобрено

17-20100090

Бетаблокада 50 mg таблетки с удължено освобождаване  
 Бетаблокада 100 mg таблетки с удължено освобождаване  
 Betablockade 50 mg prolonged-release tablets  
 Betablockade 100 mg prolonged-release tablets  
 (Метопрололов сукцинат/Metoprolol succinate)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Бетаблокада и за какво се използва
2. Преди да приемете Бетаблокада
3. Как да приемате Бетаблокада
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бетаблокада
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЕТАБЛОКАДА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Бетаблокада принадлежи към класа лекарства, наречени бета-блокери.

Използва се за лечение на:

- Повишено кръвно налягане
- Болка в сърцето или гръдния кош, причинена от недостиг на кислород до сърцето (ангина пекторис)
- Неравномерен сърдечен ритъм (аритмия)
- Инфаркт
- Сърцебиене, дължащо се на функционални сърдечни нарушения.

Използва се за предотвратяване на:

- Повторен инфаркт
- Мигрена

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ БЕТАБЛОКАДА**

Не приемайте Бетаблокада ако:

- Сте алергичен към метопролол или други бета-блокери, както и към някоя от другите съставки.
- Имате сърдечни проблеми (AV-блок от 2-ра и 3-та степен) или нарушен сърдечен ритъм
- Страдате от не лекувано сърдечно заболяване или провеждате лечение за увеличаване на сърдечните контракции или сте в шок, причинен от сърдечни

проблеми

- Имате проблеми с кръвообръщението
- Имате намален честотен ритъм (по-малко от 50 удара в минута)
- Страдате от ниско кръвно налягане

Вземате някои от следните лекарства:

- Моноамино оксидазни инхибитори (за депресия)
- Верапамил и дилтиазем
- Дисопирамид

**Обърнете специално внимание при употребата на Бетаблокада:**

- Ако страдате от астма
- Ако имате ангина на Принзметал (остри болки в гърдите, появяващи се по-често през нощта)
- Ако страдате от диабет
- Ако провеждате лечение за намаляване на алергична реакция
- Ако имате нарушена бъбречна или чернодробна функция
- Ако сте под 40 или над 80 годишна възраст
- Ако сте имате сърдечна операция пред последните 4 месеца

**Прием на други лекарства**

Не приемайте Бетаблокада ако взимате:

- Инхибитори на монооксидазата за депресия
- Други понижаващи кръвното налягане лекарства като верапамил и дилтиазем, тъй като може да забават Вашият сърдечен ритъм
- Антиаритметици като дисопирамид

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Следните лекарства могат да увеличат ефекта на понижението на кръвното налягане:

- циметидин
- хидралазин и клонидин
- тербинафин
- парокетин, флуоксетин и сертралин
- хидроксихлорокин
- хлорпромазин, трифлупромазин, хлорпротиксен
- амиодарон, хинидин и пропафенон
- дифенхидрамин
- целекоксиб
- Следните лекарства могат да намалят ефекта на понижението на кръвното налягане:
  - индометацин
  - рифампицин

Други лекарства, които могат да оказат влияние или да бъдат повлияни от метопролол са:

- други бета-блокери, например капки за нос
- адреналин, норадреналин или други симпатомитици
- лекарства за лечение на диабет
- лидокаин
- резерпин, алфа-метилдопа, гуанфакин

**Прием на Бетаблокада с храни и напитки**

Алкохолът може да увеличи кръвните нива на метопролол и поради това да се засили ефектът на лекарството.

#### **Бременност и кърмене**

Не вземайте Бетаблокада ако сте бременна, освен ако Вашият лекар не ви го предпише. Преди да вземете Бетаблокада, информирайте Вашия лекар, ако кърмите.

#### **Шофиране и работа с машини**

Преди да шофирате или да работите с машини трябва да знаете как реагирате на това лекарство, защото може да предизвика замаяване или умора.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ БЕТАБЛОКАДА**

Винаги приемайте Бетаблокада точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Бетаблокада таблетки не трябва да се дъвчат или да се смачкват. Те трябва да се поглъщат с течност.

Обикновено се препоръчва Бетаблокада таблетки да се вземат веднъж дневно с или без храна.

#### *Хипертония*

Препоръчителната дневна доза е 50 mg. При необходимост дозата може да бъде увеличена до 95-190 mg веднъж дневно.

#### *Ангина пекторис*

95-190 mg веднъж дневно.

#### *Нарушения на сърдечния ритъм*

95-190 mg веднъж дневно.

#### *Поддържащо лечение след инфаркт на миокарда*

95-190 mg веднъж дневно.

#### *Профилактика на мигренозни пристъпи*

Препоръчвана доза е 95-190 mg веднъж дневно.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Бетаблокада**

Ако има вероятност да сте взели повече Бетаблокада отколкото трябва, уведомете незабавно Вашия лекар. Ако дозата е достатъчно висока, моля да получите интоксикация, проявена с някои от следните симптоми: забавена или неритмична сърдечна дейност, задух, подуване на глезените, чувство за сърцебиене, замаяване, припадък, болка в гръдния кош, студена кожа, слаб пулс, объркване, тревожност, спиране на сърцето, чувство на гадене, загуба на съзнание.

Симптомите могат да се влошат, ако приемате алкохол, други лекарства, понижаващи артериалното налягане, хинидин или хапчета за сън едновременно с предозиране на метопролол.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Бетаблокада**

Ако пропуснете да вземете доза Бетаблокада и времето за следващата доза е по-малко от 12 часа, веднага вземете пропуснатата доза. Не приемайте двойна доза вместо пропуснатата.

#### **Ако сте спрели приема на Бетаблокада**

Не прекратявайте приема на Бетаблокада внезапно, тъй като това може да предизвика влошаване на Вашето заболяване и да увеличи риска от сърдечен удар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Бетаблокада може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Моля уведомете Вашия лекар ако получите някои от страничните реакции, изброени по-долу:

##### **Много чести (>1/10):**

- замаяност
- умора.

##### **Чести ( $\geq 1/100$ , <1/10):**

- забавена сърдечна дейност
- замайване, свързано с промяна на положението на тялото (много рядко с припадане)
- студени крайници
- гадене, главоболие
- диария, повръщане
- задух при усилие

##### **Нечести (>1/1 000, <1/100):**

- временно влошаване на симптомите на Вашето заболяване
- задържане на течности
- болка в гръдния кош
- изтръпване
- мускулни спазми
- повръщане
- загуба на телесно тегло
- депресия
- влошена концентрация
- затруднения при заспиване
- сънливост
- кошмари
- затруднено дишане
- обрив
- засилено изпотяване

##### **Редки (>1/10 000, <1/1 000)**

- влошаване на диабет
- нервност
- видимо безпокойство
- сухи или раздразнени очи
- конюнктивит
- импотентност/нарушения на сексуалната функция

- неравномерна сърдечна дейност
- сухота в устата
- хрема
- косопад
- проблеми с черния дроб

**Много редки (<1/10 000):**

- кръвни нарушения (намален брой тромбоцити и левкоцити в кръвта)
- влошаване на паметта
- объркване
- халюцинации
- промени в настроението
- шум в ушите
- вкусови промени
- хепатит
- чувствителност към светлина
- влошаване на псориазис
- мускулна слабост
- влошаване на лошо кръвообращение

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ БЕТАБЛОКАДА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не се изискват специални условия на съхранение.

Не използвайте Бетаблокада след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа Бетаблокада

- Активната субстанция е метопрололов сукцинат. Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа:
  - 47,5 mg метопрололов сукцинат еквивалентен на 50 mg метопрололов тартарат.
  - 95 mg метопрололов сукцинат еквивалентен на 100 mg метопрололов тартарат.
- другите съставки са:
  - *Сърцевина*: микрокрystalна целулоза, метилцелулоза, царевично нишесте, глицерол, етилцелулоза и магнезиев стеарат.

- *Обвивка:* Сепифилм® LP 770 :  
Хипромелоза  
Микрокристална целулоза  
Стеаринова киселина  
Титанов диоксид

**Как изглежда Бетаблокада и какво съдържа опаковката**

Бетаблокада 50 mg таблетки с удължено освобождаване са бели, овални двойно изпъкнали филмирани таблетки, с делителна черта от двете страни.

Бетаблокада 100 mg таблетки с удължено освобождаване са бели, овални двойно изпъкнали филмирани таблетки, с делителна черта от двете страни.

30 таблетки с удължено освобождаване в PVC-PE-PVDC/Al блистери.

**Притежател на разрешението за употреба**

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД  
бул.„Г.М.Димитров”1, гр. София 1172, България

**Производител**

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД  
Бул. „ Санкт Петербург” 53, гр.Пловдив, България

*За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба:*

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД  
1172 София, бул.„Г.М.Димитров” №1  
тел. 02 / 962 54 54  
факс: 02/ 960 37 03  
e-mail: info@tchaikapharma.com

**Дата на последно одобрение на листовката**