

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20070216
Разрешение №	25128 / 20-03-2014
Оборудване №	/

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

МАКМИРОР® 200 mg обвити таблетки
MACMIROR® 200 mg coated tablets
Нифурател (Nifuratel)

Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява МАКМИРОР® и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете МАКМИРОР®
3. Как да приемате МАКМИРОР®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате МАКМИРОР®
6. Съдържание на опаковката и до Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАКМИРОР® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
МАКМИРОР® 200 mg обвити таблетки съдържа активното вещество нифурател. МАКМИРОР® е показан за лечение на вулвовагинални инфекции и бяло течение, предизвикано от патогенни микроорганизми: трихомонас, монилия, мицети.

Инфекции на пикочните пътища.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ МАКМИРОР®
Не приемайте МАКМИРОР®

- ако сте свръхчувствителни към активното вещество - нифурател или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Обърнете специално внимание при употребата на МАКМИРОР®

По време на лечението трябва да се избягват половите контакти.

При наличието на глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназен дефицит е възможно възникването на хемолитична анемия.

Прием на МАКМИРОР® с храни и напитки

По време на лечението трябва да се избягва консумацията на алкохол, който може да предизвика зачервяване в областта на лицето и шията, неразположение и гадене, отзвучаващи спонтанно.



Бременност и кърмене

По време на бременност или в най-ранна детска възраст продуктът може да се използва само в случай на абсолютна необходимост под лекарски контрол.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МАКМИРОР®

Вагинални инфекции

Възрастни: по 1 таблетка 3 пъти дневно, след хранене, в продължение на 1 седмица, и за двамата партньори.

Лечението се допълва с: по 1 вагинална таблетка или 2-3 g крем вечер преди лягане за 10 дни.

Пациентите, които се лекуват само с перорално приложение трябва да приемат по 1 таблетка 4 пъти дневно.

Инфекции на пикочните пътища

Възрастни: 3 до 6 таблетки дневно, в продължение на 1-2 седмици, в зависимост от причинителя и тежестта на инфекцията.

По лекарска преценка курсът на лечение с нифурател на инфекции на пикочните пътища може без опасност да бъде удължен или повторен.

Ако сте приели повече от необходимата доза Макмирор Виe трябва:

Да се свържете веднага с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Макмирор:

Вземете пропуснатата доза възможно най- бързо.

Не вземайте двойна доза за де наваксате забравената.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарства и МАКМИРОР може да предизвика нежелани реакции, макар че не всеки ги получава.

Кажете на Вашия лекар, ако някои от долупосочените симптоми са тежки и не отзвучават:

- стомашен дискомфорт
- гадене
- повръщане
- сърбеж

Ако имате кожен обрив, веднага се обадете на Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МАКМИРОР®

Macmiror 200 mg coated tablets

01/2014



Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C.
Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Не използвайте МАКМИРОР® след срока на годност, отбелязан на опаковката.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа МАКМИРОР®

1 таблетка съдържа:

Активното вещество е: Нифурател (Nifuratel) 200 mg

Помощните вещества са: царевично нишесте, оризово нишесте, талк, магнезиев стеарат, магнезиев карбонат, желатин, захароза, полиетилен гликол 6 000, титанов диоксид, арабска гума, восък.

Как изглежда МАКМИРОР® и какво съдържа опаковката

МАКМИРОР® обвити таблетки се предлага в блистери, съдържащи 20 таблетки, поставени в картонена кутия, с приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

POLICHEM S.A.

50 Val Fleuri

L-1526 Люксембург

Производители

Doppel Farmaceutici S.R.L., Via Volturmo 48, Quinto De' Stampi, 20089 Rozzano, Milano, Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Анджелини Фарма България ЕООД

Бул. „Асен Йорданов“ 10, 1592 София

Тел.: + 359 2 975 13 95

Факс: +359 2 971 57 45

Дата на последно преразглеждане на листовката: януари 2014

