

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Магне В6 обвити таблетки

MAGNE B6 coated tablet

Magnesium, Piridoxine

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-1820, 31 03 04
Одобрено: 10 / 18.12.07

Моля прочетете тази листовка внимателно преди да започнете употребата на този лекарствен продукт. Тя съдържа важна информация за Вашето лечение.

- Пазете тази листовка, може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако Вие имате някакви въпроси, обърнете се към своя лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано на Вас от лекуващия Ви лекар и не трябва да го преотстъпвате на друг, даже и той да има същите симптоми като Вашите.

Състав:

Лекарствените вещества са:

Магнезиев лактат дихидрат (Magnesium lactate dihydrate) – 470 mg

Пиридоксин хидрохлорид или витамин В₆
(Pyridoxine hydrochloride or Vitamine B₆) – 5 mg

Помощни вещества: захароза, плътен каолин, акация, карбомер 35,000, талк, магнезиев стеарат; талк, титаниев диоксид.

Фармако-терапевтична група:

МАГНЕ-В₆ принадлежи към групата на минерални добавки.

Притежател на разрешението за употреба:

SANOFI -AVENTIS OTC
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris -Франция

Производител

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1, rue de la Vierge- 33440 Ambares - Франция

или

Chinoin Pharmaceutical and
Chemical Works Private Co. Ltd,
Habor Park Campona u.1 1222 Budapest - Унгария

Кога се използва МАГНЕ-В₆ ?

Това лекарство съдържа магнезий.

Установен магнезиев дефицит- изолиран или комбиниран, който може да бъде изразен с някои от следните симптоми:

- нервност, раздразнителност, умерена тревожност, преходна отпадналост, леки разстройства на съня;
- признаци на напрегнатост, като стомашно-чревни спазми или сърцебиене (при здраво сърце);
- мускулни крампи, изтръпване.

Прилагането на магнезий може да помогне за лечението на подобни симптоми.



Кога не трябва да се използва МАГНЕ-В₆ ?

МАГНЕ-В₆ не се използва при следните случаи:

- известна алергия към някоя от съставките (виж състава).
- остра бъбречна недостатъчност

ВАЖНО Е ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

Предупреждения

Поради наличието на захароза, това лекарство е противопоказано за диабетно болни.

Предпазни мерки при употреба

ТОВА ЛЕКАРСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА САМО ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 6 ГОДИНИ.

За деца на възраст под 6 години се предлагат подходящи лекарствени форми.

В случаи на умерена бъбречна недостатъчност, трябва да се вземат предпазни мерки за предотвратяване риска от хипермагнезиемия.

Лечението се прекратява веднага след нормализиране нивото на магнезия.

Ако след едномесечно лечение не се наблюдава подобрене на симптоматиката, обърнете се към Вашия лекар за съвет.

АКО НЕ СТЕ СИ ГУРНИ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

Важна информация преди употребата на МАГНЕ-В₆ ?

Преди употреба трябва да информирате лекуващия Ви лекар, ако имате или сте имали случаи на:

- съпътстващ калциев дефицит;
- проблеми с бъбреците;
- страдате от диабет (в таблетките се съдържа захароза).

Таблетките са предназначени за възрастни и деца над 6 години.

Възможна ли е едновременна употреба на МАГНЕ-В₆ и други лекарствени продукти ?

Трябва да информирате Вашия лекар за всяко вземано от Вас лекарство, включително и такива без лекарско предписание, съдържащи фосфатни или калциеви соли.

Може ли да се използва МАГНЕ-В₆ по време на бременност и кърмене?

Това лекарство може да се употребява по време на бременност само, ако бъде предписано от лекар.

Ако се окаже, че Вие сте бременна по време на лечението, то консултирайте се с Вашия лекар и той може да реши дали да прекъсне лечението.

Използването на това лекарство по време на кърмене трябва да се избягва.

КАТО ПРАВИЛО ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪВЕТВАТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ВЗЕМАТЕ КАКВОТО И ДА Е ЛЕКАРСТВО, КОГАТО СТЕ БРЕМЕННА ИЛИ КЪРМИТЕ.

Шофиране и работа с машини

Няма специални препоръки относно шофирането и работата с машини.

Помощни вещества, които се съдържат в лекарството и трябва да се вземат предвид трябва при употребата му.



Захароза

Дозировка и начин на употреба.

ТОВА ЛЕКАРСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА САМО ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 6 ГОДИНИ.

Възрастни: от 6 до 8 таблетки дневно, разделени на 2 или 3 приема по време на хранене.

Деца над 6 години (приблизително 20 kg): 4 до 6 таблетки, разделени на 2 или 3 приема по време на хранене.

Таблетките се поглъщат цели с голяма чаша вода.

При пропускане на дадена доза

Ако пропуснете вземането на дадена доза, продължете по предписаната схема без да вземате двойна доза.

Предозиране

Предозирането с магнезий при перорален прием по принцип не предизвиква токсични реакции при нормална бъбречна функция. Магнезиево отравяне обаче може да възникне при бъбречна недостатъчност.

Нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства и това може да предизвика нежелани лекарствени реакции, като:

- диария и коремни болки;
- кожни реакции;
- алергични реакции.

В случай на поява на някакви нежелани лекарствени реакции, веднага информирайте лекуващия Ви лекар.

Начин на съхранение

Да се съхранява при температура под 25° С.

Да не се използва след изтичане срока на годност, изписан върху опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Дата на последната редакция: март 2007

