

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Дипрогента 0,5 mg/1 mg/g маз
бетаметазон/гентамицин
Diprogenta 0,5 mg/1 mg/g ointment
betahmetasone/gentamicin

ПОТРЕБИТЕЛСКА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	2000521
Разрешение №	16189 / 19. 12. 2011

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Дипрогента и за какво се използва
2. Преди да използвате Дипрогента
3. Как да използвате Дипрогента
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дипрогента
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИПРОГЕНТА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Дипрогента е маз за прилагане върху кожата. Дипрогента се прилага за облекчаване на възпалението при чувствителни на кортикостероиди кожни заболявания (напр. алергичен дерматит, atopичен дерматит, псориазис, екзема и др.), при които е налице или се подозира инфекция, предизвикана от чувствителни на гентамицин микроорганизми.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИПРОГЕНТА

Не използвайте Дипрогента

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към бетаметазон, гентамицин или към някоя от останалите съставки на Дипрогента или към други кортикостероиди или антибиотици от групата на аминогликозидите;
- върху големи участъци от тялото, тъй като това може да увеличи абсорбираното количество.
- по-често или за по-дълго време отколкото Ви е предписал Вашият лекар.

Обърнете специално внимание при употребата на Дипрогента

- ако състоянието на кожата Ви се влоши, кожата изглежда инфектирана или силно изсушена.
- ако имате някакво заболяване или инфекция, уведомете Вашия лекар.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Преди да използвате Дипрогента уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за влиянието на продукта върху способността за шофиране и работа с машини.



3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИПРОГЕНТА

Винаги използвайте Дипрогента точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. При необходимост, той може да промени дозата в хода на лечението.

Начин на приложение

Нанасете тънък слой Дипрогента върху засегнатия участък от кожата като втриете леко. Не превързвайте и не поставяйте компреси върху обработената повърхност, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва. Не използвайте стегнати пелени или памперси при дете, лекувано с Дипрогента освен, ако Вашият лекар не Ви е посъветвал. Избягвайте приложението на Дипрогента върху дълбоки кожни рани, отворени рани, изгаряния или наранена кожа.

Честота на приложение

Обикновено два пъти дневно (сутрин и вечер) или както Ви е предписал Вашият лекар. При по-леки случаи заболяването може да се повлияе от приложение веднъж дневно.

Продължителност на лечението

Вашият лекар ще Ви посъветва кога да спрете употребата на Дипрогента.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Дипрогента

Дипрогента трябва да се използва само в препоръчаната дозировка. Свържете се с Вашия лекар, ако сте използвали Дипрогента върху големи участъци от кожата или за по-дълго време от предписаното. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако случайно погълнете Дипрогента.

Ако сте пропуснали да използвате Дипрогента

Ако забравите да използвате Дипрогента според предписанието, нанесете лекарството колкото е възможно по-скоро и след това се върнете към редовната схема на приложение.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Дипрогента може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Свържете се с Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани лекарствени реакции Ви тревожи: парене, сърбеж, раздразнена или суха кожа, възпаление или зачервяване на лицето, увеличено окосмяване, акне, промяна на цвета на кожата, изтъняване на кожата и лесно кървене, стрии или други признаци на възпаление, които не сте наблюдавали до този момент.

Ако забележите някакви други, неописани в тази листовка нежелани реакции, свържете се с Вашия лекар.

Деца и подрастващите, на които се налага да ползват Дипрогента, трябва да бъдат внимателно наблюдавани от лекаря си, тъй като лекарството се абсорбира през кожата и може да засегне ръста или да има други нежелани въздействия.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДИПРОГЕНТА

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Дипрогента след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Дипрогента

- Активните вещества са: бетаметазон 0,5 mg/g (като бетаметазонов дипропионат 0,64 mg/g) и гентамицин 1 mg/g (като гентамицинов сулфат).
- Другите съставки са: течен парафин и бял мек парафин.

Как изглежда Дипрогента и какво съдържа опаковката

Маз за прилагане върху кожата, в алуминиеви туби от 15 g.
Тубата заедно с информационна листовка е поставена в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на Разрешението за употреба

Мерк Шарп и Доум България ЕООД
бул. "Никола Вапцаров" №55, ЕКСПО 2000, ет.1
Източно крило, Сектори В1 и В2
район Лозенец
гр. София 1407, България
тел. 02/819 3737
факс: 02/862 5196
имейл: info-msdbg@merck.com

Производител

Schering-Plough Labo,
Industriepark 30,
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Белгия

Дата на последно одобрение на листовката

