

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Хепа-Мерц 3g гранули за перорален разтвор
L-орнитин-L-аспартат
Hepa-Merz 3g granules for oral solution
L-ornitine-L-aspartate

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	2000 706
Разрешение №	11.15.352, 17.10.2011
Одобрение №	1

Моля, прочетете внимателно преди употреба!

Запазете тази листовка, тъй като тя може да Ви е необходима отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Не протстъпвайте това лекарство на други хора. То може да им навреди, дори, ако техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни, или забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е Хепа-Мерц и за какво се използва
2. Преди да използвате Хепа-Мерц
3. Как да използвате Хепа-Мерц
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хепа-Мерц
6. Допълнителна информация

1. Какво е Хепа-Мерц гранули и за какво се използва?

Хепа-Мерц е лекарствен продукт, който ускорява отделянето на амоняк от организма чрез увеличаване синтеза на уреа в черния дроб.

Освен това способства за ускореното отделяне на амоняк от тъканите извън черния дроб.

Хепа-Мерц се използва за лечение на съпътстващи и последващи усложнения, поради нарушена чернодробна детоксикационна функция (например цироза на черния дроб)

2. Преди да използвате Хепа-Мерц

Хепа-Мерц не трябва да се прилага при:

Да не се използва при свръхчувствителност към L-орнитин-L-аспартат, жълто-оранжев оцветител E110 или друга от съставките на продукта.

При тежко нарушение на бъбречната функция (бъбречна недостатъчност) Стойността на серумния креатинин над 3 mg./100 ml може да служи като референтна стойност).

Няма налични данни за употребата на лекарствения продукт при деца

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Хепат-Мерц или могат да бъдат повлияни?

Моля, информирайте Вашия лекар ако приемате/сте приемали доскоро други лекарствени продукти, дори и ако те са без лекарско предписание.

До този момент няма данни за лекарствени взаимодействия с други продукти.

Бременност и кърмене:

Безопасността на този продукт при употреба по време на бременност или кърмене не е доказана. Не е известно дали лекарственото вещество преминава в кърмата. Моля, информирайте Вашия лекар, ако сте бременна, кърмите или ако планирате да забременеете и приемайте този продукт, само ако Ви е предписан от лекар. Попитайте Вашия лекар или фармацевт преди приема на всеки лекарствен продукт.

Ефект върху способността за шофиране и работа с машини:

Поради естеството на лекуваното заболяване способността за шофиране и работа с машини може да бъде намалена по време на лечението с Хепат-Мерц.

Важна информация за някои от съставките на Хепат-Мерц гранули:

Този лекарствен продукт съдържа фруктоза. Ако знаете, че имате непоносимост към някои захари, преди приема му се свържете с Вашия лекар.

Едно саше съдържа 1,13 g фруктоза, което отговаря на 0,11 ВU (хлебни единици). Да се има предвид при пациенти, страдащи от захарен диабет.

При продължителна употреба Хепат-Мерц гранули може да бъде вреден за зъбите (кариес)

3. Как можете да използвате Хепат-Мерц?

Винаги приемайте Хепат-Мерц гранули точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако не е предписано друго обичайната доза е: 1-2 сашета до 3 пъти дневно.

Начин на прилижение:

Съдържанието на сашето се разтваря в много течност (например чаша вода, чай или сок) и се изпива по време или след хранене.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество Хепат-Мерц

Не са наблюдавани признаци на интоксикация при предозиране на L-орнитин-L-аспартат. При необходимост Вашият лекар ще приложи симптоматично лечение.

Какво да предприемете, ако сте пропуснали приложение на продукта?

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Ако сте пропуснали приложение на продукта, моля продължете според инструкциите за дозиране.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар ли фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства Хепат-Мерц гранули може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава

Честотата на наблюдаваните нежелани реакции се определя по следната схема:

Много чести:	>1/10 пациента
Чести:	>1/100, < 1/10 пациента
Не чести:	>1/1000, < 1/100 пациента
Редки:	>1/10000, < 1/1000 пациента
Много редки:	< 1/10000, включително единични случаи

Възможни нежелани реакции:

Не чести: гадене, повръщане, болки в стомаха, газове, диария

Много редки: болки в крайниците

Тези нежелани реакции обикновено са преходни, но те не налагат спиране на лечението

Хепат-Мерц гранули съдържа жълто-оранжев оцветител Е110, който може да предизвика алергични реакции.

Ако забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Хепат-Мерц:

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Да не се употребява след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката!

Да се съхранява при температура под 25° С!

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Хепат-Мерц гранули за перорален разтвор

Активно вещество:

L-ornithine-L-aspartate (L-орнитин-L-аспартат)

1 саше от 5 g съдържа 3g L-орнитин-L-аспартат

Другите съставки са:

Лимонена киселина, захарин-натрий, натриев цикламат, Повидон 25, фруктоза, овкусители (тетрааром лимон и портокал), жълто-оранжев оцветител (Е 110)

Как изглежда Хепи-Мерц и какво е съдържанието на опаковката
Гранулите са оранжеви на цвят
Налични са оригинални опаковки съдържащи x 30 сашета.

Притежател на разрешението за употреба:

Притежател на разрешението за употреба

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt / Main
Германия
Производител:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt / Main
Германия

Медицинско представителство в България:
Либра ЕАД

Дата на последна редакция на листовката:
Декември 2010