

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РОВАХОЛ КАПСУЛИ

ROWACHOL CAPSULES

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Приложение 2
Към РУ №: 11-5499 / 13.08.09
Одобрено: N-6/29.06.2009

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация:

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ в случай, че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява РОВАХОЛ и за какво се използва
2. Преди да приемете РОВАХОЛ
3. Как да приемате РОВАХОЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате РОВАХОЛ
6. Допълнителна информация

Какво представлява РОВАХОЛ

Всяка капсула Ровахол съдържа следните активни вещества: Алфа-Пинен 13.6 мг; Бета-Пинен 3.4 мг; Камфен 5.0 мг; Цинеол 2.0 мг, Ментон 6.0 мг; Ментол 32.0 мг; Борнеол 5.0 мг;

Помощно вещество: маслиново масло 33.0 мг в една мека разтваряща се в червата стомашно устойчива желатинова капсула.

Действие: Ровахол спомага за разграждането на жлъчни камъни. Посредством Ровахол се разтварят холестериновите камъни в жлъчката и се намалява концентрацията на холестерол в жлъчката. Препаратът има мощно стимулиращо отделянето на жлъчка (холеретично) действие, вследствие на което се намалява задържането на жлъчка (холестазата). В резултат на болкоуспокояващото действие на лекарствения продукт се намаляват болките, дължащи се на спазъм. Отстраняват се съпътстващите нарушения на храносмилането, без необходимост от назначаване на допълнителни лекарствени продукти.



Показания: Съпътстващо симптоматично лечение при заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, включващи холелитиаза – камъни в жлъчката , холецистит – възпаление на жлъчния мехур, спазъм на жлъчния мехур, дискинезия на жлъчните пътища – нарушена двигателна активност на жлъчните пътища, холангит – възпаление на жлъчните пътища. Препоръчва се също така при предоперативно и постоперативно лечение на черния дроб и жлъчните пътища и с оглед предотвратяване на повторно образуване на камъни.

Не приемайте Ровахол при следните противопоказания: Свръхчувствителност към активните или някое от помощни вещества.

Преди да приемете Ровахол

Предпазни мерки: Използването на Ровахол трябва да се започва след като се вземе предвид опасността от усложнения при вече съществуващи камъни в жлъчните пътища, като механична жълтеница, възпаление на жлъчните пътища, възпаление на задстомашната жлеза и др. Вашият лекар трябва да бъде информиран за предприетото лечение с Ровахол.

Прием на други лекарства

Лекарствени взаимодействия: Ровахол не трябва да се използва при пациенти, приемащи противосъсирващи кръвта лекарства през устата или други медикаменти, които се преработват в черния дроб.

Препоръчва се намален прием на холестерол-съдържащи продукти в диетата.

Бременност и кърмене : Поради липса на достатъчно клинични проучвания не се препоръчва приема на Ровахол по време на бременност и кърмене. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приема на лекарства.

Не са установени ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции: При малък брой болни са отбелязани прояви на оригване или вкус на мента след хранене, които могат да се намалят или избегнат чрез прием на лекарствения продукт, 30 минути преди хранене. При незначителен брой пациенти са отбелязани болезненост и разязвяване на лигавицата на устната кухина, която бързо отзвучава след преустановяване на приема на лекарството.

Как да приемате Ровахол

Начин на приложение и дозировка

Възрастни и деца над 14 години: Ако лекарят не е предписал друго, обичайната дозировка е по 1 капсула 1-2 пъти дневно, 30 минути преди хранене.

Деца от 6 до 14 години: Ако лекарят не е предписал друго, обичайната дозировка е по 1 капсула 1-2 пъти дневно, 30 минути преди хранене.

Приема се перорално.



Отпуска се по лекарско предписание

Срок на годност: 5 години

Опаковка : Флакони, съдържащи по 30 меки със зелен цвят желатинови капсули.

Съхранение: Да се съхранява при температура под 25°C, на място недостъпно за погледа и досега на деца.

Не използвайте Ровахол ако забележите белези за нарушаването на качеството на продукта и след срока на годност отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Производител и притежател на разрешението за употреба:

Rowa-Wagner GmbH&Co KG ,

Arzneimittelfabrik,

Frankenforster straÙe 77,

D-514-27 Bergish Gladbach,

Германия

Tel.: +49 2204 61081

Дата на последна актуализация на текста

Юни 2008 г.

